

BETEG NEVE:

ELHAGYANDÓ GYÓGYSZER:

VIZSGÁLAT NAPJA:

IDEJE:

A VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS (COLONOSCOPIA) ELŐTT 1 HÉTTTEL MÁR NE FOGYASSZON APRÓ MAGVAS GYÜMÖLCSÖT, MAGVAS PÉKÁRUT, PARADICSOMOT, PAPRIKÁT, UBORKÁT, stb. mert az endoscop csatornáinak dugulását okozzák!
A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON: OLDJON FEL 3 TASAK ENDOGOL HASHAJTÓT 2.5 LITER CSAPVÍZBEN.
REGGELIZZEN, MAJD NAPKÖZBEN BŐSÉGESEN IGYON FOLYADÉKOT: KÁVÉ, TEA, ÁSVÁNYVÍZ, SZÜRT GYÜMÖLCSLÉ (almalé, szőlőlé), SZŐRP, TEASZÜRÖN ÁTSZÜRT HÚSLEVEST. TEJET, TEJTERMÉKET NE FOGYASSZON!
11:30-KOR EGYEN KORAI EBÉDET: HÚSLEVES TÉSztÁVAL, TOJÁSOS NOKEDLIT vagy GRÍZESTÉSztÁT, vagy KENYERET MAGÁBAN. ETTŐL KEZDVE TILOS A DARABOS ÉTEL, TURMIX stb. FOGYASztÁSA !
15:30 – IGYA MEG 3 ÓRÁN BELÜL A FELOLDOTT 2.5 L HASHAJTÓT, AZ ELSŐ POHÁRRAL VEGYE BE A 2 TBL. DULCOLAXOT! OLDJA FEL ÚJABB 1 ZACSKÓ ENDOGOL HASHAJTÓT 1 L VIZBEN ÉS TEGYE EL MASNAPRA. FIGYELEM: KOPLALÁS NEM HELYETTESÍTI A HASHAJTÁST, ÜRÍTTETŐ REFLEXET KIKAPCSOLJA! IGYON SOKAT!
A VIZSGÁLAT NAPJÁN TILOS A DARABOS ÉTEL, TURMIX FOGYASztÁSA!
IGYA MEG 4 ÓRÁVAL (.....-kor) A VIZSGÁLAT ELŐTT AZ 1 LITERES HASHAJTÓT! ETTŐL KEZDVE TILOS A FOLYADÉKFOGYASztÁS! HA ZAVAROS FOLYADÉK ÜRÜL ÉS NEM ÁTTETSZŐ LÉ, IGYON 5dl HUNYADI , VAGY MIRA GLAUBERSÓS HASHAJTÓT!!! FIGYELEM! ELÉGTELEN ELŐKÉSZÍTÉS ESETÉN A VIZSGÁLATOT 1 ÉVEN BELÜL MEG KELL ISMÉTELNI, AKÁR A VIZSGÁLAT IS MEGHIÚSULHAT! HA VALAMIT NEM ÉRT, HÍVJA A RENDELŐT, KÉRDEZZEN!

Tisztelt Hölgyem, Uram! **Vastagbél tükrözést** azért végzünk, hogy a bél belsejében lévő elváltozásokat felfedezzük: polypot, daganatot, szűkületet, gyulladást. Az endoscopos vizsgálat lehetővé teszi a polyp eltávolítását, vérzéscsillapítást, szövettani mintavételt. A vizsgálat során a 1.4 m hosszú, 11 mm átmérőjű endoscopos cső a végbélen keresztül bevezetve halad végig a vastagbélben. Általában 90-100 cm hosszan kerül az eszköz bevezetésre. Az eszköz kb. 3-5 percig tartó előre haladása **kellemetlenséget okoz, melyet** ellentartással, gyógyszeres előkészítéssel enyhítünk. A vizsgálat során a végzett beavatkozás **vérzést, a vastagbél kilyukadását** idézheti elő elsősorban olyan betegségek mellett, ahol a belfal eleve beteg. Ennek előfordulási aránya 1:2000 vizsgálat. Felhívjuk a figyelmét, hogy bélszűkülettel járó betegség esetén (polyp, daganat) az előkészítés alatt a bélben a szűkület felett pangó, korábban Ön által már elfogyasztott ételmaradék, mag, rostos héj beékelődhet, és **elzáródásos tünetet** okozhat. Az elzáródás ilyen esetben az előkészítés nélkül is bekövetkezik és az Ön betegsége okozza, nem az előkészítés. Ilyen esetben forduljon a legközelebbi Sürgősségi Befogadóhelyhez! **HA PACEMAKER, MÉLY AGYI STIMULÁTOR (DBS) VAGY CARDIOVERTER-DEFIBRILLÁTOR (ICD) VISELŐ, TÁJÉKOZTATNIA KÖTELES ERRŐL MINKET!** Ilyen esetben a vizsgálat csak speciális orvosi team jelenlétében lehetséges!

IDŐPONT-MEGÉRKEZÉS-KÍSÉRŐ-ELŐLEG: A vizsgálat napján kérjük, hogy **CSAK A MEGBESZÉLT IDŐPONTRA ÉRKEZZEN** rendelőnkbe. A vizsgálat elhúzódhat akkor, ha operatív endoscopiára (polyp levételre, tágitásra, vérzéscsillapításra) kerül sor. A vizsgálat a **TERVEZETT IDŐPONT ELŐTT NEM KEZDŐDIK.** Tájékozódjon az interneten nyitva tartásunkról, kapunyitás csak nyitvatartási időben!!!

SZEDÁLÁS: Amennyiben szedálást (midazolam) kér a vizsgálatához, a vizsgálat során fellépő AMNAEZIA miatt gépkocsit vezetni, egyedül közlekedni nem tud. **KÍSÉRŐVEL**, vagy TAXI-val érkezzen. Kérjük, hogy **EGYNÉL TÖBB KÍSÉRŐT NE HOZZON MAGÁVAL!** **GYÓGYSZERÉRZÉKENYSÉGÉT ELŐRE JELEZZE, SZEDETT GYÓGYSZEREIT UGYANCSAK!!!**

ALTATÁS: Ha **NARCOSISBAN** kéri vizsgálatát, **előzetesen altathatósági vizsgálaton kell átesnie.** Az intravénás narcosist a Király Klinikával megkötött közreműködői szerződés alapján **Közreműködő harmadik személy (altatóorvos)** végzi. Az intravénás narcosis végrehajtására **Közreműködő külön megállapodást köt a beteggel, így tevékenységéért a beteg irányában közvetlenül felelőséggel Ő tartozik.** A Király Klinika (Achalasia Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság) az intravénás narcosissal kapcsolatosan felmerülő felelősségét kizárja, valamennyi komplikációval kapcsolatos felelősség a **Közreműködőt terheli.**

GYÓGYSZERELÉS MEGVÁLTOZTATÁSA: A vizsgálat előtt 5 nappal ne vegye be pl. Plavix, Ticlid (clopidogrel, pasugrel, ticlopidin) tartalmú gyógyszereit, Syncumar, Marfarin, Pradaxa, Xarelto, Eliquis stb. **(acenokumarol, kumarin, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban stb.)** tartalmú egyéb vérhígító kezelést fel kell függeszteni, **HEPARIN injectióját a vizsgálat napján ne adja be!** Ezen szerek használatáról a vizsgáló orvost tájékoztatni kell! A gyógyszerek újratekérésének időpontjáról és mikéntjéről a vizsgáló orvosa dönt, elkezdni csak az Ő engedélyével szabad! Ha **endocarditis profilaxist** kell önnél alkalmazni, kérjük, Ön is jelezze! A 15-60 percig tartó vizsgálat után kevés vérzés jelentkezhet. **Ha a vérzés nagy volumenű, ha a hasa puffadt, fájdalmas, lázas lesz, haladéktalanul jelezze vizsgáló orvosának az operatív beavatkozás utáni betegek tájékoztatóján megadott telefonon! Hátterintézményünk: PTE SBO, Mohács, VK.**

NARCOSIS (ALTATÁTORVOS ÁLTAL VÉGZETT ALTATÁSOS VIZSGÁLATOT) kérek: igen nem

MÉLY AGYI STIMULÁTOR (DBS) vagy CARDIOVERTER-DEFIBRILLÁTOR (ICD) viselek: igen nem

BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT:

A vastagbél tükrözés technikáját, a vizsgálat előkészítését, kivitelezését, a vizsgálat lehetséges szövödményeit, az alternatív vizsgálati technikákat megértettem, a szükséges tájékoztatást megkaptam, a vizsgálat elvégzésébe beleegyezem.

Szedett gyógyszereim:

Meghatalmazom kezelőorvosomat, hogy(név).....szül. részére egészségügyi adatimról cselekvőkép telenségem esetén információt adhasson.

Pécs, 202..... Beteg Tájékoztatót adó orvos